花柳病治療學

痘厄潰爛。及痘後除毒不清。頭 取牆上白色者佳火堰一南)寒水石(另研細末二錢)橄欖核(煅存性二錢)冰片

頭蟆蚣缨二條。射香冰片各一分。為末和勻用紅棗四兩。黃熱去皮

粉揚宜食大華黑豆生用冷水泡軟去皮同紅棗肉搗爛為九加西黃三分尤妙

證保實切有用信求務版出

品藥驗靈種各售代館本

丸濁白新最

州李惠民監製

專治一切新久咳嗽神效無比 每袋分三次服每日食後開水調 服或加冰糖少許尤佳 服或加冰糖少許尤佳

(丁)膏丸方四元 次日

(乙)門診一元

(甲)特號二元

士醫

診

(戊)急病隨請隨到

花不民家小由論性的病 柳下間庭樂 現物識和 所方習醫養 報生 醫療 治 用樂 截生 醫療 之常 捷 生 應 型 具

楊志一著・・・

病家和醫生應具的常識

(上) (田小順)

:吐血與肺痨

家庭醫藥常識

稿投迎献

少則肺氣清 。尤為最要。 北海縣。杜其根株。勢必毎年復 東陽中之品。書云牌為生養之源 東陽中之品。書云牌為生養之源 (三)

方祕今古開公

(六十)

○論児棗

强身丸

鸣智用之胞衣不下方 爱爲之記。 (一志楊)

○未研中醫根本之學。而性極機 ○服石灰水可下。蓋昔年余內子 ○服石灰水可下。蓋昔年余內子 ○服石灰水可下。蓋昔年余內子 法中。為用石灰登斤。以水烊化 法中。為用石灰登斤。以水烊化 法中。為用石灰登斤。以水烊化 法中。為用石灰登斤。以水烊化 本即見下。余喜出望外。而因知 本即見下。金喜出望外。而因知 本即是下。金喜出望外。而因知 本即是下。金喜出望外。而因知 本即是下。金喜出望外。而因知 本即是下。卷喜出望外。而因知 本於東埔購大黃丸二枚。復往湯 在大黃丸。盡兩碗。胞衣果下。

÷1

i.

服法 主强合身此治力宜體允 治力宜體允 知力宜體允 知力宜體允 知力宜體允 可開人再服是頭腰男色身卻能弱質 水小用時服 B接子然體病耐者和 冲發開先廿 服與選過處 延心用平 爛無水將粒 花軟精度弱 年常以功 後齒送九晚 耳自女精面 服調效 永補偉 下用如嘱十心盜白疲肌 可最大 亦熱老爛粒 跳汗帶爐瘦 身為凡